








**TANNINI**

# ENARTISTAN ANTIBOTRYTIS

Miscela di tannini idrolizzabili ad azione antiossidante e antiossidasica

	<p><b>COMPOSIZIONE</b> Miscela di tannini gallici, tannino ellagico di castagno.</p>
	<p><b>CARATTERISTICHE GENERALI</b> EnartisTan Antibotrytis è una miscela composta dai tannini più efficaci nel limitare i processi di ossidazione a danno di mosti e vini:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ i tannini gallici ed ellagici aiutano la deproteizzazione di mosti e vini e in particolare, la rimozione di tirosinasi e laccasi, enzimi ossidasici responsabili dell'ossidazione dei mosti prodotti rispettivamente dall'uva e dalla <i>Botrytis cinerea</i>.</li> <li>▪ I tannini ellagici chelano rame e ferro, metalli coinvolti sia nell'ossidazione chimica del vino sia, il rame, nell'ossidazione dei mosti in quanto cofattore dell'attività di tirosinasi e laccasi.</li> </ul> <p>Nel trattamento di mosti e vini ottenuti da uve sane e soprattutto in quelli ottenuti da uve affette da Botrite, EnartisTan Antibotrytis previene la perdita di qualità causata dall'ossidazione di materia colorante e aromi e svolge un'azione antiossidante sinergica a quella esercitata dalla SO<sub>2</sub>.</p>
	<p><b>APPLICAZIONI</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Trattamento antiossidante e antiossidasico di mosti e vini ottenuti da uve affette da Botrytis cinerea e marciume</li> <li>• Vendemmia meccanica</li> <li>• Tempi lunghi di trasporto da vigneto a cantina.</li> <li>• Macerazione pre-fermentativa</li> <li>• Protezione antiossidante di mosti e vini</li> <li>• Miglioramento della stabilità proteica</li> </ul>
	<p><b>DOSI</b> Mosto: 3 – 20 g/hL Vino: 2 – 10 g/hL</p>
	<p><b>MODALITÀ D'USO</b> Sciogliere EnartisTan Antibotrytis in rapporto 1:10 in acqua, mosto o vino sotto costante agitazione. Aggiungere all'uva non appena c'è fuoriuscita di mosto. Aggiungere al vino o al mosto in rimontaggio tramite pompa dosatrice o tubo Venturi. Per aggiunte in vino, si consiglia di effettuare delle prove preventive di laboratorio per valutare l'impatto organolettico del tannino e per la messa a punto del dosaggio. Si raccomanda inoltre, di effettuare l'aggiunta di EnartisTan Antibotrytis nelle prime fasi dell'affinamento fino ad un massimo di 1 ÷ 2 settimane prima dell'imbottigliamento. In caso di aggiunte in prossimità dell'imbottigliamento, si raccomanda di valutarne l'effetto su filtrabilità e stabilità proteica e colloidale del vino realizzando prove preventive di laboratorio.</p>
	<p><b>CONFEZIONI E CONDIZIONI DI CONSERVAZIONE</b> 1 kg – 10 kg Confezione chiusa: conservare in luogo fresco, asciutto e ventilato. Confezione aperta: richiudere accuratamente e conservare come indicato sopra,</p>
	<p><b>CONFORMITÀ</b> Prodotto per uso enologico, secondo quanto previsto da: Reg. (UE) 2019/934</p>

Le indicazioni qui riportate corrispondono allo stato attuale delle nostre conoscenze ed esperienze, comunque non sollevano l'utilizzatore dal rispetto delle norme di sicurezza e protezione o dall'utilizzo improprio del prodotto.